



**자녀의 나이가 만 6세 미만인 경우, 특히 아래의 질문들에 대한 답변이 “예”라면 납 검사에 대해 의사와 상의하십시오.**

**예    아니요**

- 자녀가 Medicaid 또는 Apple Health에 가입할 자격을 갖추고 있습니까?
- 자녀가 1978년 이전에 지어진 주택, 특히 상태가 좋지 않거나 최근에 개조한 주택에 거주하거나 이러한 주택을 정기적으로 방문합니까?
- 자녀에게, 혈중 납 수치 상승이 확인된(또는 최근에 확인된) 형제자매나 친구가 있습니까?
- 자녀가 납을 다루는 직업이나 취미를 가진 부모 또는 보호자와 함께 시간을 보냅니까?
- 음식이나 음료를 조리하거나 보관하거나 내는 데 사용하는 용기, 그릇, 크리스탈 식기, 주석 그릇 또는 조리기구(특히 압력 조리기구) 중 다른 나라에서 생산된 것이 있습니까?
- 자녀가 전통 민간 요법 제제를 복용하거나 수입 화장품을 사용한 적이 있습니까? 예: 그레타, 아자르콘, 가사드, 바바우산, 수르마, 신두르, 콜.
- 자녀가 다른 나라에서 입양되었거나 다른 나라에 거주했거나 다른 나라를 방문한 적이 있습니까?
- 자녀가 공항이나 제련소 근처에 위치한 주택에 거주하거나 이러한 주택을 정기적으로 방문합니까?
- 자녀에게 발달 지연이나 행동 문제가 있습니까?
- 자녀에게 이식증(음식이 아닌 것을 반복적으로 먹는 행동)이 있습니까?

납 중독은 징후나 증상이 나타나지 않는 경우가 많습니다.

아동에게 납 중독이 발생했는지 알 수 있는 유일한 방법은 검사를 받는 것입니다.



[www.snohd.org/lead](http://www.snohd.org/lead)