

感冒、流感或冠状病毒?

中文 - Chinese	感冒	流感	感冒冠状病毒
 <p>症状和体征 症状因人而异。不是每个人都会 有各种症状。记住，哪怕是一个症 状也可能表明疾病。</p>	<p>所有症状:咳嗽·喉咙痛·流鼻涕或鼻塞·呼吸困难·疲劳·肌肉疼痛或身体疼痛·可能呕吐和腹泻</p>		
		<p>流感和冠状病毒:发烧或发冷·头痛</p>	
			<p>新近丧失味觉或嗅觉</p>
 <p>传染多久?</p>	<p>症状开始前1-2天, 只要症状存在, 就保持传染性</p>	<p>最初3-4天最具传染性; 症状开始前 1天和症状开始后7天可能会传染</p>	<p>症状开始前2天到症状开始后10天 (有时更长)</p>
 <p>在家呆多久? *遵循医疗机构或公共卫生人员 的独居/隔离说明</p>	<p>感冒和流感:直到至少24小时没有发烧(不用药物)和其他症状得到 改善</p>		<p>直到至少24小时无发热(无药 物)和其他症状改善, 并且自症 状开始或检测日期起10天以 上。如果与确诊病例接触, 在最 近一次接触后隔离14天*</p>
 <p>它是如何传播的?</p>	<p>所有传播方式:最常见的传播方式是病人咳嗽、打喷嚏或说话时产生的飞沫。飞沫可以落在附近人的口或鼻中, 或可能被吸入肺部。唾液可能会落在人们接触的表面, 人们触摸后会在触摸近嘴、眼睛或鼻子的地方时 传染。可能在他们开始出现症状之前传播给其他人。</p>		
 <p>患有严重疾病的高危人群 *不确定自己是否是高危人群?和你的 医疗提供者谈谈。</p>	<p>所有人:老年人·患有某些潜在疾病的人*如肺病或心脏病、糖尿病或肥胖·孕妇·婴儿·免疫抑制剂患者</p>		
		<p>与COVID-19相比, 健康儿童患流感 并发症的风险更高</p>	<p>患有COVID-19的学龄儿童患 多系统炎症综合征(MIS-C)的 风险更高</p>
 <p>并发症</p>	<p>链球菌性咽喉炎·哮喘发作</p>	<p>流感和共济失调:肺炎·呼吸衰竭·急性呼吸窘迫综合征·脓毒 症·心脏病发作·中风·多器官衰竭·慢性疾病恶化·心脏、大脑 或肌肉组织炎症·继发性细菌感染</p>	
		<p>感冒和流感:鼻窦和耳朵感染·支气管炎·肺炎</p>	
			<p>肺、心脏、腿部或大脑的静脉和 动脉中的血栓·儿童多系统炎 症综合征(MIS-C)</p>
 <p>治疗和疫苗</p>	<p>缓解症状的支持性护理。没有疫苗</p>	<p>每年提供流感疫苗。治疗流感 的抗病毒药物</p>	<p>症状的支持性护理。FDA没有批准任 何药物或疫苗来预防或治疗COVID</p>