

코로나19 예방 접종 받기



대유행으로 힘든 시기를 보냈습니다. 이제 코로나19로부터 우리를 보호할 두 가지 예방 접종이 출시되었습니다.



두 예방 접종 모두 무료로 제공됩니다.

연방 정부가 예방 접종 비용을 부담합니다. 서비스 제공자가 예방 접종 비용을 부과할 수 있지만, 건강 보험으로 보장받을 것입니다. 비용을 감당할 수 없는 경우, 공급자가 비용을 면제할 것입니다.



2회 투여해야 합니다.

3~4주 간격으로 2회 접종해야 합니다.



두 예방 접종 모두 안전하고 효과적입니다.

예방 접종은 94~95%의 효과가 있습니다. U.S. Food and Drug Administration(미국식품의약국)은 예방 접종을 긴급 사용을 승인했으며 심각한 안전 문제를 발견하지 못했습니다. 독립적인 전문가들은 예방 접종이 높은 안전성 및 효능 기준을 충족한다고 확인했습니다.



위험도가 가장 높은 군이 먼저 예방 접종을 받습니다.

현재 모든 사람이 받을 수 있는 충분한 양의 예방 접종이 준비되지 않았습니다. 따라서 보건부는 먼저 예방 접종을 받을 군을 선택해야 했습니다. 1차 투여는 의료 시설의 고위험 근로자와 장기 요양 시설의 거주자 및 직원에게 제공될 예정입니다. 충분한 양을 확보하면 모든 사람이 예방 접종을 받을 수 있습니다.



부작용을 느낄 수 있습니다.

다른 정기 예방 접종과 마찬가지로, 예방 접종을 받은 후 팔 통증, 발열, 두통 또는 피로를 느낄 수 있습니다. 이는 예방 접종이 효과가 있다는 징후입니다.



안전하게 지내세요.

예방 접종을 받은 후 마스크를 쓰고, 2미터 간격을 유지하고, 예방 접종을 받지 않은 사람들을 위해 모임을 작게 하세요.

질문이 있으신가요? www.CovidVaccineWA.org를 방문하세요.

코로나19 예방 접종 받기

어떤 예방 접종이 있나요?

두 가지 예방 접종이 있습니다.

1. Pfizer-BioNTech
2. Moderna

두 예방 접종 모두 FDA의 긴급 사용을 승인받았습니다. Advisory Committee for Immunization Practices와 Western States Scientific Safety Review Workgroup의 의료 전문가들은 예방 접종이 우리의 안전 기준을 충족한다고 확인했습니다.

누가 코로나19 예방 접종을 받아야 하나요?

예방 접종을 받는 것은 개인의 선택입니다. 예방 접종을 받기로 한 경우, 다음 사항을 예방 접종 제공자에게 알려야 합니다.

- 심한 알레르기 반응의 병력이 있음
- 열이 있음
- 출혈 장애가 있거나 혈액 희석제 복용 중
- 면역력이 저하되었거나 면역 체계에 영향을 미치는 약을 복용 중
- 임신 중이거나 임신 계획이 있거나 수유 중
- 다른 코로나19 예방 접종을 받았음

이전에 받은 코로나19 예방 접종이나 예방 접종의 성분에 심각한 알레르기 반응을 보인 적이 있다면 예방 접종을 받으면 안 됩니다.

예방 접종에는 활성 성분인 메신저 RNA(mRNA)와 더불어 지방, 염분, 당이 포함되어 mRNA를 보호하고 신체에서 더 잘 작동하도록 돕습니다.

Pfizer-BioNTech 예방 접종을 받으려면 최소 16세 이상이고 Moderna 예방 접종을 받으려면 18세 이상이어야 합니다.

어떤 부작용이 있을까요?

예방 접종을 받은 후 1~3일 후에 부작용이 발생하는 것은 일반적인 일입니다. 일반적인 부작용은 피로, 근육통, 주사를 맞은 팔의 통증, 발열, 두통, 관절통, 오한, 메스꺼움 또는 구토입니다. 증상이 사라지지 않으면 의사나 진료소에 문의하시기 바랍니다.

예방 접종 장소를 떠나기 전에 15분에서 30분 정도 기다려 알레르기 반응이나 기타 부작용이 나타나는 경우 예방 접종 제공자가 도울 수 있도록 하세요. 기다리는 동안 v-safe에 가입하여 부작용을 보고하고 2차 투여에 대한 알림을 받아볼 수 있도록 하세요:

vsafe.cdc.gov(영어로만 제공).

귀하 또는 귀하의 예방 접종 제공자는 Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERS, 예방 접종 이상 반응 보고 시스템)에 부작용을 보고할 수도 있습니다:

vaers.hhs.gov/reportevent.html(영어로만 제공).

진료소를 떠난 후 알레르기 반응이 나타나면 911에 전화하세요. 알레르기 반응의 징후로는 호흡 곤란, 얼굴과 목의 부기, 빠른 심장 박동, 전신 발진, 현기증, 힘 없음이 있습니다.

예방 접종을 받은 후 다음 단계는 무엇인가요?

2차 투여를 예약하세요. 3~4주 후에 다시 방문해 2차 투여를 받아야 합니다. 2차 투여 후 최대 2주가 지나야 완전히 보호됩니다.

예방 접종을 받으려면 몇 달을 기다려야 하는 사람이 많습니다. 예방 접종을 받은 후 마스크를 쓰고, 2미터 간격을 유지하고, 아직 예방 접종을 받지 않은 사람들을 보호하기 위해 모임을 작게 하세요.



DOH 348-782 December 2020 Korean

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127번으로 전화해 주세요. 청각 또는 난청 장애 고객의 경우, 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일(civil.rights@doh.wa.gov)을 이용하시기 바랍니다.